

ذیابیطس کیا ہے؟

جب آپ کو ذیابیطس بوجاتا ہے تو آپ کا جسم آپ کی غذا میں موجود توانائی کا استعمال نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کے جسم کو انسولن بنانے اور اس کا استعمال کرنے میں دشواری بوربی بوتی ہے۔ انسولن ایک ایسا بارمون ہے جو خون میں موجود شکر کے استعمال میں آپ کے جسم کی مدد کرتا ہے۔ ذیابیطس کی دو اہم قسمیں ہیں: قسم 1 اور قسم 2۔

- **قسم 1 ذیابیطس میں آپ کا جسم انسولن کم مقدار میں یا بالکل نہیں بناتا ہے۔**
- **قسم 2 ذیابیطس میں آپ کا جسم عموماً انسولن بناتا ہے لیکن آپ کا جسم اس کا اچھی طرح استعمال نہیں کر پاتا۔**

دونوں قسموں کے ذیابیطس میں آپ کے خون میں شکر کی مقدار بڑھنے لگتی ہے کیونکہ اس کا استعمال نہیں بو پاتا ہے۔ شکر آپ کے خون میں ربتا ہے اور آپ کے بلڈ شوگر کی مقدار کا درج زیادہ بوجاتا ہے۔ خون میں شکر کی بڑھی بؤی مقدار آپ کی خون کی نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور ایک طویل مدت کے دوران زیادہ سنگین طبی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اپنے خون میں شکر کی مقدار کے درج کو نارمل سے قریب تر رکھ کر آپ درج ذیل مسائل کے امکانات کم کر سکتے ہیں:

- آنکھوں سے جڑے مسائل
- گردوں کے مسائل
- پاؤں اور / یا ٹانگ کا قطع جراحی
- جنسی مسائل
- دل کا دورہ اور اسروک

حمل سے متعلق ذیابیطس اس وقت بوتا ہے جب حمل کے دوران آپ کے خون میں شکر زیادہ ہو۔ حمل سے متعلق ذیابیطس حمل کے دوران عورتوں کے جسم میں بونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بوتا ہے۔ اگر آپ حامل بیس تو اپنے ڈاکٹر سے حمل سے متعلق ذیابیطس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

قسم 2 ذیابیطس

قسم 2 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کا علاج مناسب غذائی منصوبہ بندی، ورزش، منہ سے لینے والی دواؤں اور / یا انسولن کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ قسم 2 ذیابیطس سب سے عام قسم کا ذیابیطس ہے۔ حالانکہ یہ کم سن لوگوں میں بو سکتا ہے لیکن یہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو بوتا ہے:

- جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو
- جن کا وزن بڑھا بوا ہو
- ذیابیطس کی خاندانی تاریخ والے افراد
- حمل کے دوران ذیابیطس میں مبتلا رہی ہوں
- 9 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کے بچے کو جنا ہو
- جو بیماری یا چوٹ کے وجہ سے ذہنی دباء میں ہوں
- جنہیں بائی بلڈ پریشر ہے
- جو افریقی امریکی، بسپانوی امریکی، یا دیسی امریکی ہوں

اس کی علامات میں شامل ہیں:

- تھکاوٹ محسوس کرنا
- خشک، خارشی جلد
- باٹھوں یا پیروں میں بیحسی یا جھنجرھنا بٹ
- بار بار انفکشن ہونا
- بار بار پیشاب آنا
- بینائی دھنڈلی ہونا
- جنسی اعمال میں دشواری
- زخم یا کٹے پھٹے کی شفا میں زیادہ وقت لگنا

قسم 2 ذیابیطس کے اکثر کوئی علامات نہیں ہوتے۔

آپ یا آپ کے خاندان کے کسی بھی فرد کو اگر مذکورہ بالا سے کوئی بھی تین یا اس سے زیادہ علامات ہوں، تو آپ کو ذیابیطس کی جانچ کرانی چاہئے۔

قسم 1 ذیابیطس

قسم 1 ذیابیطس میں مبتلا افراد کو اپنے خون کی شکر کو قابو میں رکھنے کے لئے انسولن کا انجکشن لینا چاہئے۔ قسم 1 ذیابیطس عام طور پر نوجوانی میں شروع ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بھی عمر میں بو سکتا ہے۔

- **قسم 1 ذیابیطس کے وجہات کا تعلق درج ذیل سے ہے:**
 - خاندان میں قسم 1 ذیابیطس کی تاریخ
 - ایسا جسمانی مسئلہ جس کی وجہ سے انسولن بنانے والی خلیات ناکارہ بو جاتی ہیں۔

علامات میں شامل ہیں:

- زیادہ پیاس لگنا
- پیشاب زیادہ ہونا
- بھوک زیادہ لگنا
- اچانک وزن کم ہونا
- بہت تھکن محسوس کرنا

کیٹھوایسیدوسیس (Ketoacidosis) ایسی سنگین مسئلہ ہے جو عام طور پر صرف قسم 1 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں میں بوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم انسلن کا استعمال نہیں کر پاتا تو یہ خون میں موجود شکر کا استعمال بھی توانائی حاصل کرنے کے لئے نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ سے جسم چکنائی کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے فضولات جمع ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کیٹھوایسیدوسیس میں مبتلا ہیں تو آپ یہ علامات ظاہر کر سکتے ہیں:

- معمول سے زیادہ بھوک اور پیاس محسوس کرنے کے کرنا یا پیٹ میں درد ہونا
- سانس میں پہل جیسی مہک آنا
- سانس تیز اور گھری ہونا
- بخار ہونا

• پیشاب کی جانچ میں پٹی کا رنگ بدل جانا

- خون میں شکر کی مقدار کا درج mg/dl 240 یا اس سے زیادہ ہونا

آپ کو کیٹھوایسیدوسیس کا علاج خود کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے! اپنے ڈاکٹر کو فوراً اطلاع دیں!



پائیپوگلاتسیمیا کیا ہے؟

پائیپوگلاتسیمیا، یا خون میں کم شکر، تب بوتا ہے جب آپ کے خون میں شکر کی مقدار کا درجہ معمول سے کم، یا 70 mg/dl سے کم ہو جائے۔

علامات میں شامل ہیں:

- غیر معمولی طور سے بھوک یا پیاس کا بڑھنا
- زیادہ پیشاب بونا، خصوصاً رات میں
- خشک اور خارشی جلد
- تھکان اور نیند کا احساس
- دھنلی بینائی
- بار بار انفکشن بونا

Hyperglycemia کا علاج

Hyperglycemia کا علاج بہت ضروری ہے۔ آپ کی تشخیص بونے کے چند گنہوں کے ابدر علاج کا شروع ہو جانا۔ علاج میں دوا یا دوا کی خوراک میں تبدیلی، زیادہ احتیاط سے غذا کی منصوبہ بنندی، اور باقاعدگی سے ورزش شامل ہو سکتے ہیں۔

ذیابیطس سے متعلق مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں:
MetroPlus کیئر مینجنمنٹ ایکشن لائن
1-800-579-9798

اس لیفٹلیٹ کی معلومات کا مقصد آپ کے ڈاکٹر کی صلاح اور طبی دیکھ بھال کا بدل بونا ہے۔ آپ سے متعلق انفرادی حقائق کی بنا پر آپ کے ڈاکٹر کا علاج یہاں پر مذکورہ طریقہ سے مختلف ہو سکتا ہے۔

MetroPlus Health Plan
160 Water St. 3rd Fl, New York, NY 10038

ممبران کے لئے معلومات:

1-800-303-9626

میٹروپلس بیلٹن پلان سے متعلق معلومات:

1-800-475-METRO

www.MetroPlus.org

02/07 (URD)

پائیپوگلاتسیمیا کا علاج

آپ کو **فوراً** اپنے کم بلڈ شوگر کا علاج کرانا چاہئے۔ اگر آپ کا بلڈ شوگر 70 mg/dl سے کم ہے اور آپ حاملہ نہیں یہیں تو ان میں سے ایک لیں:

• 1/2 کپ پہل کا رس یا معمولی سوڈا (بغیر شکر والا نہیں)

• ایک کھانے کا چمچہ شہد یا شکر

اگر آپ 15 منٹوں میں بہتر محسوس نہ کریں تو شکر کی کوئی چیز کھا کر پھر کوشش کریں۔ اگر آپ کا بلڈ شوگر پھر بھی کم ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو اطلاع دیں!

پائیپرگلاتسیمیا کیا ہے؟

پائیپرگلاتسیمیا، یا خون میں زیادہ شکر، تب بوتا ہے جب آپ کے خون میں شکر کی مقدار کا درجہ معمول سے زیادہ، یا کھانا کھانے سے قبل 120 mg/dl یا کھانے کے بعد 180 mg/dl ہو جائے۔ اگر یہ اکثر بوتا ہے تو اس

